

Zulassungsaufgaben und Anwendungsbestimmungen in bezug auf Abstände zu Oberflächengewässern (NW-Sätze), Hangneigung und Nichtzielorganismen																
Kultur	Schadorganismus / Indikation	Aufwandmenge	Anwendungstermin	Abstand zu Oberflächengewässern in m					zu Saumkulturen angrenzende 20 m mit mind. x % driftmindernder Technik				Auflage für drainierte Flächen	Wartezeit	Einstufung Bienengefährdung	
				Standard	abtriftmindernde Technik			bewachsener Randstreifen bei > 2% Hangneigung	Standard	abtriftmindernde Technik					solo	Auflagen
					50%	75%	90%			50%	75%	90%				
Kartoffel	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,9 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser	vor dem Auflaufen, kurz vor dem Durchstoßen	5 m	5 m	*	*	20 m	-	-	-	20 m		42	B4	NB6641
Kartoffel	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,6 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser	nach dem Auflaufen bis 5 cm Kartoffelhöhe	5 m	*	*	*	10 m	-	-	20 m		42			
Spargel	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,9 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser	vor der Stechperiode nach dem Aufrichten der Dämme oder nach der Stechperiode nach Einebnen der Dämme	5 m	5 m	*	*	20 m	-	-	20 m		7 bzw. F (nach der Ernte)			
Sojabohne ^G	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,4 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha	vor dem Auflaufen	5 m				10 m	-	20 m			F			
Spargel ^G	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,5 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha	nach dem Durchstoßen, nach dem Auflaufen der Unkräuter	5 m					-	-	20 m		F			
Spargel ^G	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,75 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha	7-10 Tage nach dem Pflanzen im Pflanzjahr, vor dem Durchstoßen	5 m	5 m	*	*	10 m	-	-	20 m		F			
Baumschulgehölzpflanzen ^G	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,75 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha	vor der ersten Nutzung, vor dem Auflaufen der Unkräuter	5 m	5 m	*	*	10 m	-	-	20 m	Keine Anwendung auf gedrahten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	N			
Spargel ^G	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,45 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha	vor der Stechperiode und nach der Stechperiode	5 m	5 m	*	*		-	-	20 m	Keine Anwendung auf gedrahten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	F			
Möhre ^G	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	0,3 l/ha in 400 - 600 l Wasser/ha	nach dem Auflaufen						-	20 m			42			
Möhre ^G	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	Zeitpunkt 1: 0,1 l/ha in 400 - 600 l Wasser/ha Zeitpunkt 2: 0,2 l/ha in 400 - 600 l Wasser/ha	nach dem Auflaufen						-	20 m			42			

G: Genehmigung für Lückenindikation

*: Bundeslandspezifischen Mindestabstand zu Oberflächengewässern beachten.

NB6611: Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.

NB6621: Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr, eingestuft(B2).Es darf außerhalb dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter.Bienenschutzverordnung vom 22.Juli 1992, BGBl.I S. 1410, beachten.

NB663: Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet(B3).

NB6641: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft(B4).

NB6613: Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen befliegen werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese - Hemmer angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen befliegen werden, ist ausweislich der Gebrauchsanleitung des Fungizids erlaubt.Die Bienenschutzverordnung in der geltenden Fassung ist zu beachten

NB6645: Das Mittel darf in Mischung mit einem als nicht bienengefährlich eingestuften Insektizid aus der Gruppe der Neonikotinoide an blühenden Pflanzen und Pflanzen, die von Bienen befliegen werden, angewendet werden, sofern dies ausweislich der Gebrauchsanleitung des Insektizids erlaubt ist.

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B.Ernte) verbleibt bzw.die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

N: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.