



Mesuro[®] flüssig (Zierpflanzen)

Methiocarb 500 g/l, Zul. Nr. 043599-00
Zulassungsende: 31.07.2019

Lückenindikationen

Kultur	Anwendungsbereich	Schadorganismus	Erläuterung	BBCH	Anwendungszeitpunkt	Max. Zahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Max. Zahl der Behandlungen für die Kultur bzw. je Jahr	Aufwandmenge	Sonstige Kennzeichnungsaufgaben	Wartezeit in Tagen	Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
Zierpflanzen	Gewächshaus	Minierfliegen	bis 50 cm Pflanzengröße		bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	3	3	0,6 l/ha in 600 l/ha Wasser	SE110, SF1891, SS110, SS2101, SS610	N	-
Zierpflanzen	Gewächshaus	Thripse	bis 50 cm Pflanzengröße		bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen	3	3	0,6 l/ha in 600 l/ha Wasser	SE110, SF1891, SS110, SS2101, SS610	N	-

Für das Produkt Mesuro[®] flüssig (Zierpflanzen) gelten bei Genehmigungen folgende Kennzeichnungsaufgaben:

(SE110) Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SF1891) Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

(SS110) Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SS2101) Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SS610) Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

Stand: 17.02.2019