Contans® WG

Coniothyrium minitans , Zul. Nr. 034346-00
Zulassungsende: 31.07.2033

Lückenindikationen

Kultur	Anwendungs-bereich	Schadorganismus	Erläuterung	Stadium Kultur	Anwendungs-zeitpunkt	Max. Zahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Max. Zahl der Behandlungen für die Kultur bzw. je Jahr	Aufwandmenge	Sonstige Kennzeichnungs-auflagen	Wartezeit in Tagen	Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
Ackerbaukulturen	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung/ Sclerotinia-verseuchte Ernterückstände		nach der Ernte	1	2	**2 kg/ha** in 200 - 500 l/ha Wasser	NW642-1	F	-
Zierpflanzen	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung/ Sclerotinia-verseuchte Ernterückstände		nach der Ernte	1	2	**2 kg/ha** in 200 - 500 l/ha Wasser	NW642-1	N	-
Zierpflanzen	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung		bei Befallsgefahr (vor der Pflanzung bzw. Saat, jedoch mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion)	1	2	- Einarbeitungstiefe (bis 10 cm): **4 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser - Einarbeitungstiefe (bis 20 cm): **8 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	NW642-1	N	-
Zierpflanzen	Gewächshaus	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung/ Sclerotinia-verseuchte Ernterückstände		nach der Ernte	1	2	**2 kg/ha** in 200 - 500 l/ha Wasser	-	N	-

Kultur	Anwendungs-bereich	Schadorganismus	Erläuterung	Stadium Kultur	Anwendungs-zeitpunkt	Max. Zahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Max. Zahl der Behandlungen für die Kultur bzw. je Jahr	Aufwandmenge	Sonstige Kennzeichnungs-auflagen	Wartezeit in Tagen	Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
Zierpflanzen	Gewächshaus	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung		bei Befallsgefahr (vor der Pflanzung bzw. Saat, jedoch mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion)	1	2	- Einarbeitungstiefe (bis 10 cm): **4 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser - Einarbeitungstiefe (bis 20 cm): **8 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	-	N	-
Ackerbohne	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung		nach der Bodenbearbeitung, vor dem Pflanzen (jedoch mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion)	1	2	- Einarbeitungstiefe (bis 10 cm): **4 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser - Einarbeitungstiefe (bis 20 cm): **8 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	NW642-1	F	-
Tabak	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung		nach der Bodenbearbeitung, vor dem Pflanzen (jedoch mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion)	1	2	- Einarbeitungstiefe (bis 10 cm): **4 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser - Einarbeitungstiefe (bis 20 cm): **8 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	NW642-1	F	-
Kartoffel	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung/ in Beständen zur Pflanzguterzeugung		nach der Bodenbearbeitung, vor dem Legen(jedoch mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion)	1	2	- Einarbeitungstiefe (bis 10 cm): **4 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser - Einarbeitungstiefe (bis 20 cm): **8 kg/ ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	NW642-1	F	-

Kultur	Anwendungs-bereich	Schadorganismus	Erläuterung	Stadium Kultur	Anwendungs-zeitpunkt	Max. Zahl der Behandlungen in dieser Anwendung	Max. Zahl der Behandlungen für die Kultur bzw. je Jahr	Aufwandmenge	Sonstige Kennzeichnungs-auflagen	Wartezeit in Tagen	Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
Sonnenblume	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung		vor der Saat	1	2	**8 kg/ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	NW642-1	F	-
Gemüsekulturen	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung		bei Befallsgefahr (vor der Pflanzung bzw. Saat, jedoch mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion)	1	2	- Einarbeitungstiefe (bis 10 cm): **4 kg/ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser - Einarbeitungstiefe (bis 20 cm): **8 kg/ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	NW642-1	F	-
Gemüsekulturen	Freiland	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung/ Sclerotinia-verseuchte Ernterückstände		nach der Ernte	1	2	**2 kg/ha** in 200 - 500 l/ha Wasser	NW642-1	F	-
Gemüsekulturen	Gewächshaus	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung/ Sclerotinia-verseuchte Ernterückstände		nach der Ernte	1	2	**2 kg/ha** in 200 - 500 l/ha Wasser	-	F	-
Gemüsekulturen	Gewächshaus	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	Verminderung der Bodenverseuchung		bei Befallsgefahr (vor der Pflanzung bzw. Saat, jedoch mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion)	1	2	- Einarbeitungstiefe (bis 10 cm): **4 kg/ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser - Einarbeitungstiefe (bis 20 cm): **8 kg/ha** in 200 - 1000 l/ha Wasser	-	F	-

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

N: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.

Für das Produkt Contans® WG gelten bei erweiterte Zulassungen folgende Kennzeichnungsauflagen:

(NW642-1) Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.