

DKC 3323

Mittelfrüh | S 230 | K 250



Früher Dreifachnutzer mit Top-Ertrag

SORTENEIGENSCHAFTEN

- // Großrahmige Pflanze mit ausgeprägtem Staygreen für ein sicheres Erntefenster
- // Sehr gute Jugendentwicklung, auch auf Grenzstandorten
- // Kombination aus Volumen, Qualität und Kornertrag für flexible Nutzung
- // Genetik für stabile Leistungen auch bei begrenzenden Bedingungen

TOP 3 LEISTUNGSVORTEILE

- 1 Kornertrag**
Sehr hohes Kornertragspotenzial für maximale Flexibilität
- 2 TM-Ertrag**
Massebetonter Dreifachnutzer für volle Silos und breite Einsatzmöglichkeiten
- 3 Stärkeertrag**
Hohe Qualität für leistungsfähige Silagen und effiziente Futtermittelverwertung

DKC 3323

Mittelfrüh | S 230 | K 250



Agronomisches Profil

PFLANZEN-PHYSIOLOGIE

Korntyp ¹	2		Hartmaisähnlich						
Kolbenflex	semi-fix								
Wärmesumme ²	850 °C		Zur weiblichen Blüte (Basis 6°C)						
Pflanzenlänge ²									
Jugendentwicklung ²									
Neigung zu Lager ²									
Staygreen ²									

AUSSAATSTÄRKENEMPFEHLUNG

Silomais					
bis 13 to GTM / ha		bis 13 – 17 GTM / ha		über 17 GTM / ha	
Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas
80	85	95	100	100	100

ERTRAGSEIGENSCHAFTEN

Trockenmasseertrag ²								
Stärkegehalt ²								
Stärkeertrag ²								
NEL-Gehalt ²								
NEL-Ertrag ²								
Zellwandverdaulichkeit ²								
Spezifische Biogasausbeute ³								
Biogasertrag ³								
Kornertrag ²								
Drydown ²								

Körnermais		
Niedrig	Mittel	Hoch
7 – 9 to/ha	9 – 11 to/ha	11 – 14 to/ha
85	100	100

* Amtlich empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetauftritten der zuständigen Länderdienststellen.

¹ Einstufungen nach offiziellen Zulassungseinstufungen

² Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Versuchsergebnissen (Züchtung und Produktentwicklung): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.

³ Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Bewertungen nach Rath, J., H. Heuwinkel, F. Taube & A. Herrmann, 2014: Predicting Specific Biogas Yield of Maize-Validation of Different Model Approaches. BioEnergyResearch, Volume 7 (Number 4): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.

* Amtlich empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetauftritten der zuständigen Länderdienststellen.