# DKC 3856

**Mittelspät I K 260**

NEU



## Der Körnermais-Spezialist

### SORTENEIGENSCHAFTEN

// Kompakter Körnermais

// Gute Standfestigkeit

// Gute Jugendentwicklung

### TOP 3 LEISTUNGSVORTEILE

**1 Kornertrag**
Sehr hohe Kornerträge

**2 Drydown**
Hervorragende Wasserabgabe reduziert Trocknungskosten

**3 Gesundheit**
Gute Blattgesundheit unterstützt eine optimale Kornfüllung

# DKC 3856

**Mittelspät I K 260**

NEU

## Agronomisches Profil

### PFLANZEN-PHYSIOLOGIE

| | | |
|---|---|---|
| **Korntyp**[1] | 4 | Zahnmaisähnlich |
| **Kolbenflex** | semi-flex | |
| **Wärmesumme**[2] | 920 °C | Zur weiblichen Blüte (Basis 6°C) |
| **Pflanzenlänge**[2] | ■■■■■ | |
| **Jugendentwicklung**[2] | ■■■■■■ | |
| **Neigung zu Lager**[2] | ■■ | |
| **Staygreen**[2] | ■■■■■ | |

### ERTRAGSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Kornertrag**[2] | ■■■■■■■■ |
| **Drydown**[2] | ■■■■■■■ |

### AUSSAATSTÄRKENEMPFEHLUNG

| Körnermais | | |
|---|---|---|
| **Niedrig** | **Mittel** | **Hoch** |
| 7 – 9 to/ha | 9 – 11 to/ha | 11 – 14 to/ha |
| 80 | 85 | 90 |

[1] Einstufungen nach offiziellen Zulassungseinstufungen
[2] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Versuchsergebnissen (Züchtung und Produktentwicklung): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.
[3] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Bewertungen nach Rath, J., H. Heuwinkel, F. Taube & A. Herrmann, 2014: Predicting Specific Biogas Yield of Maize-Validation of Different Model Approaches. BioEnergyResearch, Volume 7 (Number 4): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.