EZ3342* / DKC08362

Früh | S 220

NEU

Großrahmiger Allrounder mit starker Qualität

SORTENEIGENSCHAFTEN

- // Zügige Jugendentwicklung
- // Ertragsstark auf allen Ertragslagen mit sehr guter Stabilität
- // Lange Pflanze mit mittlerem Kolbensitz

TOP 3 LEISTUNGSVORTEILE

1. **TM-Ertrag**
   Extrem hohes GTM-Ertragspotenzial
2. **Biogas**
   Extrem hohes Biogasertragspotenzial
3. **Kornertrag**
   Sehr hohes Kornertragspotenzial für zusätzliche Nutzungsflexibilität

* vorl. Sortenbezeichnung, Sortenzulassung wird unter DKC08362 erwartet.

EZ3342* / DKC08362

Früh | S 220

SILO EXTRA

NEU



DEKALB

BAYER

Agronomisches Profil

PFLANZEN-PHYSIOLOGIE

Korntyp[1]	2	Hartmaisähnlich
Kolbenflex	semi-flex	
Wärmesumme[2]	870 °C	Zur weiblichen Blüte (Basis 6°C)
Pflanzenlänge[2]	■■■■■■■■■	
Jugendentwicklung[2]	■■■■■■■■	
Neigung zu Lager[2]	■■■	
Staygreen[2]	■■■■■	

ERTRAGSEIGENSCHAFTEN

Trockenmasseertrag[2]	■■■■■■■■■
Stärkegehalt[2]	■■■■■■
Stärkeertrag[2]	■■■■■■■
NEL-Gehalt[2]	■■■■■
NEL-Ertrag[2]	■■■■■■■
Zellwandverdaulichkeit[2]	■■■■■■■
Spezifische Biogasausbeute[3]	■■■■■■
Biogasertrag[3]	■■■■■■■■■
Kornertrag[2]	■■■■■■■■
Drydown[2]	■■■■

AUSSAATSTÄRKENEMPFEHLUNG

Silomais					
bis 13 to GTM / ha		**bis 13 – 17 GTM / ha**		**über 17 GTM / ha**	
Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas
85	90	90	95	95	100

* vorl. Sortenbezeichnung, Sortenzulassung wird unter DKC08362 erwartet.

[1] Einstufungen nach offiziellen Zulassungseinstufungen
[2] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Versuchsergebnissen (Züchtung und Produktentwicklung): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.
[3] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Bewertungen nach Rath, J., H. Heuwinkel, F. Taube & A. Herrmann, 2014: Predicting Specific Biogas Yield of Maize-Validation of Different Model Approaches. BioEnergyResearch, Volume 7 (Number 4): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.